

#PrEPme

#Bmore4PrEP

¿Es difícil tomar PrEP?

No! Tomar PrEP es muy fácil, pero hay que recordar los siguientes pasos cuando tomas PrEP, incluyendo:

- ❖ Hay que tomar una pastilla al día, aproximadamente en el mismo horario, todos los días. Esa pastilla se llama Truvada
- ❖ Hacer exámenes regulares, cada 3 meses, para checar por VIH y ETS
- ❖ Tener visitas regulares con su proveedor de salud para tomar un examen de sangre y resurtir su receta medica

Tal vez presentes molestias de estómago y dolor de cabeza al empezar PrEP. Estas molestias normalmente desaparecen un mes

Deberías considerar el uso de PrEP si tú

- ❖ A veces no usas condones al tener sexo vaginal o anal
- ❖ No siempre le dices a tu pareja que debe usar condón
- ❖ Has sido diagnosticado con alguna enfermedad transmitida sexualmente (ETS) en los últimos 6 meses
- ❖ No estás seguro(a) si tu pareja(s) tiene(n) VIH
- ❖ Estás en una relación con una pareja que tiene VIH (sin importar si está en tratamiento o no)
- ❖ Eres una persona que usa drogas inyectables, o estás en una relación con una persona que usa drogas inyectables
- ❖ No tienes VIH, pero te interesa tomar PrEP

PrEP está cubierto por la mayoría de los seguros de salud y también por Medicaid. Programas de asistencia con pagos también están disponibles, aún si no tiene seguro de salud. Tu proveedor de servicios de salud y r epresentante de PrEP te pueden ayudar averiguar los detalles de tu seguro y opciones de programas de asistencia